

# Comprendre le traitement par RADICAVA<sup>MD</sup> IV Perfusion

Une ressource destinée aux  
personnes atteintes de  
sclérose latérale  
amyotrophique (SLA) à qui  
RADICAVA<sup>MD</sup> IV a été prescrit



<sup>Pr</sup> **Radicava**<sup>MD</sup>  
(édaravone) perfusion IV  
à 30mg/100mL

## Pour commencer

Cette brochure est conçue pour vous renseigner sur ce que vous pouvez attendre du traitement par RADICAVA<sup>MD</sup> IV et vous fournir des renseignements qui vous aideront à communiquer plus efficacement avec les membres de votre équipe de soins de santé.

Souvenez-vous : plus vous en saurez et mieux vous serez équipé pour prendre des décisions éclairées au sujet de votre santé.

<sup>Dr</sup> **Radicava**<sup>MD</sup>  
(éदारavone) perfusion IV  
à 30mg/100mL



*N'oubliez pas que cette brochure ne vise pas à remplacer toute directive, toute aide ou tout conseil fournis par votre équipe de soins de santé.*



# À propos de la SLA

La sclérose latérale amyotrophique (SLA), ou maladie de Lou Gehrig, est une maladie neurologique (du système nerveux) évolutive qui touche les cellules nerveuses (les motoneurones) dans le cerveau et la moelle épinière.

La SLA s'attaque aux motoneurones qui commandent les muscles du corps, ce qui provoque une faiblesse et une incapacité progressives. La mort de ces cellules perturbe le contrôle et le mouvement des muscles volontaires.

1

La SLA débute dans le cerveau et la moelle épinière, où elle s'attaque aux cellules nerveuses appelées « motoneurones ».

2

Les motoneurones vont du cerveau à la moelle épinière et de la moelle épinière aux muscles volontaires, dans tout le corps.


3

Les motoneurones assurent une voie de communication vitale entre le cerveau et les muscles responsables des mouvements nécessaires entre autres à la marche, à la mastication, à la respiration et à la parole.

**Sclérose** : formation de tissu cicatriciel ou durcissement

**Latérale** : côté (de la colonne vertébrale)

**Amyotrophique** : dégénérescence d'un muscle privé de nutriments



# Apprendre à connaître RADICAVA<sup>MD</sup> IV

## Qu'est-ce que RADICAVA<sup>MD</sup> IV?

PrRADICAVA<sup>MD</sup> IV (édavarone) administré par perfusion intraveineuse est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter les patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA).

## Comment RADICAVA<sup>MD</sup> IV agit-il?

On ignore la façon exacte dont RADICAVA<sup>MD</sup> IV agit dans le corps chez les personnes atteintes de SLA. RADICAVA<sup>MD</sup> IV ralentit la perte des fonctions physiques comme l'élocution, la déglutition, l'écriture, le découpage de la nourriture et d'autres fonctions.



## Ce que vous devriez dire à votre professionnel de la santé avant d'utiliser RADICAVA<sup>MD</sup> IV

Pour essayer d'éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant de recevoir RADICAVA<sup>MD</sup> IV et mentionnez-lui tous vos problèmes de santé, notamment si :

- vous êtes atteint d'asthme;
- vous êtes allergique à d'autres médicaments ou aux sulfites;
- vous êtes enceinte ou prévoyez de le devenir.
  - On ignore si RADICAVA<sup>MD</sup> IV est dangereux pour votre enfant à naître.
- vous allaitez ou prévoyez de le faire.
  - On ne sait pas si RADICAVA<sup>MD</sup> IV passera dans votre lait maternel.
  - Vous et votre professionnel de la santé déciderez si vous recevrez RADICAVA<sup>MD</sup> IV ou si vous allaiterez.

Vous devriez aussi informer votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les suppléments naturels ou les produits de médecine douce.

*N'utilisez pas RADICAVA<sup>MD</sup> IV si vous êtes allergique à l'édaravone ou à tout autre ingrédient de RADICAVA<sup>MD</sup> IV, notamment aux sulfites.*



Ingrédient médicamenteux : édaravone

Ingrédients non médicinaux : chlorhydrate de L-cystéine hydraté, bisulfite de sodium, chlorure de sodium, acide phosphorique et hydroxyde de sodium, eau pour injection.

**Pour obtenir de plus amples renseignements,  
veuillez vous reporter à la brochure qui vous a été remise.**

En cas de doute, parlez à votre professionnel de la santé avant d'utiliser RADICAVA<sup>MD</sup> IV.

# En quoi consiste votre traitement par RADICAVA<sup>MD</sup> IV

RADICAVA<sup>MD</sup> IV sera administré par perfusion intraveineuse. Cela signifie que le médicament sera perfusé directement dans la veine.

- Il faut environ 1 heure pour recevoir la dose complète de RADICAVA<sup>MD</sup> IV.
- Vous serez suivi de près pendant votre traitement par RADICAVA<sup>MD</sup> IV.

Votre professionnel de la santé décidera de la dose appropriée pour vous.

La dose habituelle de RADICAVA<sup>MD</sup> IV est :



- Un cycle de traitement initial avec une dose quotidienne de RADICAVA<sup>MD</sup> IV pendant 14 jours, suivi d'une période sans administration de 14 jours.
- Des cycles de traitement de suivi pendant lesquels vous recevrez RADICAVA<sup>MD</sup> IV 10 jours sur 14, suivis d'une période de 14 jours sans administration.

*Vous et votre professionnel de la santé déciderez pendant combien de temps vous recevrez RADICAVA<sup>MD</sup> IV*

Parlez à votre prestataire de soins pour connaître toutes les solutions adaptées à votre cas.

**Vous pouvez recevoir RADICAVA<sup>MD</sup> IV :**



À domicile



Au centre  
de perfusion



Au cabinet  
du médecin



***Besoin d'un rappel?***

*Utilisez un appareil électronique qui peut vous envoyer un rappel pour vous aider à vous souvenir de vos rendez-vous de perfusion.*

## Que faire en cas de surdosage

Si vous croyez avoir pris trop de RADICAVA<sup>MD</sup> IV, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.



# À quoi s'attendre avant le traitement

## Conseils pour bien vous préparer avant la perfusion

Souvenez-vous que votre traitement durera environ 1 heure.  
Les jours où vous recevez le traitement, pensez à



**porter des vêtements confortables;**  
porter des vêtements amples, décontractés;



**apporter de l'eau et/ou une collation.**  
Il sera plus facile de trouver une veine si vous êtes bien hydraté;

**apporter des objets pour augmenter votre confort ou pour vous aider à passer le temps :**



Un oreiller/une couverture



Des écouteurs



Une tablette



Des mots croisés



Un livre

# Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à l'utilisation de RADICAVA<sup>MD</sup> IV?

Les effets secondaires les plus fréquents de RADICAVA<sup>MD</sup> IV sont notamment des bleus, des problèmes de marche et des maux de tête.

**Pr Radicava<sup>MD</sup>**  
(édaravone) perfusion IV  
à 30mg/100mL



# Effets indésirables graves et mesures à prendre

Vous devez cesser immédiatement de prendre RADICAVA<sup>MD</sup> IV et consulter un médecin sans délai si vous présentez un quelconque symptôme d'hypersensibilité (d'allergie), de réaction allergique aux sulfites, y compris :



Urticaire



Étourdissements



Problèmes respiratoires



Respiration sifflante



Démangeaisons



Évanouissement



Enflure des lèvres,  
de la langue et/ou du visage



Crise d'asthme  
(chez les personnes asthmatiques)

Votre professionnel de la santé pourrait décider de ne pas continuer le traitement par RADICAVA<sup>MD</sup> IV si vous présentez une réaction allergique.

*Sachez qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les effets secondaires possibles que vous pourriez manifester avec RADICAVA<sup>MD</sup> IV. En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.*

# Soutien pour toute la durée du traitement



**Le Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup>** est un programme qui repose sur une équipe dévouée de gestionnaires de cas en soins infirmiers, d'agents chargés du traitement des cas et de spécialistes du remboursement qui travaillent ensemble pour aider les personnes qui reçoivent RADICAVA<sup>MD</sup> IV.

Les services du Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup> comprennent :

- L'enseignement au sujet de RADICAVA<sup>MD</sup> IV
- Le repérage des options de couverture d'assurance pour votre patient
- La coordination des tests de capacité vitale forcée afin de déterminer l'admissibilité à la couverture d'assurance
- La réalisation des tests d'évaluation du score ALSFRS-R afin de déterminer l'admissibilité à la couverture d'assurance
- L'organisation des commandes et des fournitures des médicaments
- L'assistance pour l'administration du traitement (si nécessaire)
- Un soutien financier pour faciliter le paiement de la quote-part
- La réalisation d'appels de suivi après chaque cycle de traitement



## Des questions?

N'hésitez pas à prendre contact avec le Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup> à tout moment pendant votre traitement au :

☎ **1 833 211-MTPT (6878)** ✉ **MTP@innomar-strategies.com**

L'équipe du Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup> est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE.

## Ressources additionnelles


*Que vous souhaitiez en savoir plus sur la SLA ou bénéficier du soutien et de l'expérience d'autres personnes, n'hésitez pas à communiquer avec les organismes suivants :*

**Société canadienne de la SLA**  
www.als.ca | 1 800 267-4257 (sans frais)

**The ALS Association**  
www.alsa.org









### Le Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup> peut vous aider

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous comme suit :

☎ **1 833 211-MTPT (6878)** ou ✉ **MTP@innomar-strategies.com**

L'équipe du **Programme de soutien aux patients MTP<sup>MD</sup>**  
est disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h HE.

RADICAVA, le logo de RADICAVA IV et le symbole de la société Mitsubishi Tanabe Pharma Canada sont des marques de commerce de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, utilisées sous licence par Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.

Le Programme de soutien aux patients MTP et le logo du Programme de soutien aux patients MTP sont des marques de commerce de Mitsubishi Tanabe Pharma Canada, Inc.



Mitsubishi Tanabe Pharma Canada

